

1. Recoltarea de sânge pentru investigații de laborator se face:
  - a) Prin puncție venoasă dimineața a jeun;
  - b) În timpul frisoanelor pacientului;
  - c) La indicația medicului;
  - d) Toate variantele sunt corecte.
2. După administrarea subcutanată a insulinei pot apărea următoarele complicații:
  - a) Hipoglicemia;
  - b) Hiperglicemia;
  - c) Reacție alergică locală;
  - d) Alergia sistemică;
3. Garoul elastic se aplică la:
  - a) Deasupra puncției;
  - b) La 10 cm sub locul puncției;
  - c) La nivelul arterei carotide în caz de puncție a venei jugulare;
  - d) La extremitatea membrului contralateral;
4. În cazul unei insuficiențe respiratorii acute prin aspirare de corp străin în căile aeriene, care este atitudinea terapeutică?
  - a) Manevra Heimlich;
  - b) Intubația;
  - c) Administrarea de medicamente cu efect bronhoconstrictor;
  - d) Aerosoli.
5. Criza de astm bronșic se caracterizează prin:
  - a) Spută rozată cu bradipnee;
  - b) Spută cu aspect perlat;
  - c) Dispnee cu caracter expirator;
  - d) Bradipnee.
6. Conduita de urgență în edemul pulmonar acut este:
  - a) Așezarea bolnavului în poziție șezândă;
  - b) Aplicarea garoului la rădăcina membrilor;
  - c) Administrarea oxigenului pe sonda nazo – faringiană;
  - d) Toate variantele sunt posibile.
7. Durerea în infarctul miocardic acut prezintă următoarele caracteristici:
  - a) Localizare retrosternală sau precordială;
  - b) Localizare în abdomenul inferior însoțită de meteorism abdominal și diaree;
  - c) Localizare lombară însoțită de disurie;
  - d) Localizare mandibulară însoțită de adenopatii și sindrom febril.
8. Caracteristicile colicii renale sunt:
  - a) Localizare suprapubiană iradiată în tot abdomenul, durere vie;
  - b) Localizare toracică;
  - c) Localizare în hipocondrul drept cu iradiere în umărul drept;
  - d) Localizare lombara unilaterală cu iradiere de-a lungul ureterului și organelor genitale.

9. Care este medicamentul de elecție în cazul unui pacient care prezintă șoc anafilactic?
- Antihistaminice orale;
  - Administrare orală de lichide;
  - Adrenalina;
  - Antialgice.
10. Măsurile de urgență în entorse sunt următoarele, cu excepția:
- Combaterea durerii;
  - Imobilizarea articulației cu atele;
  - Administrarea de bronhodilatatoare;
  - Anestezia generală;
11. Mijloacele de protecție împotriva virusului imunodeficienței umane (HIV) ale cadrelor medii sunt, cu excepția?
- Purtarea corectă a echipamentului de protecție;
  - Evitarea înțepăturilor accidentale cu ace după utilizare;
  - Respectarea circuitului instrumentarului folosit;
  - Efectuarea tratamentului injectabil fără mănuși de protecție;
12. Simptomatologia în tuberculoza pulmonară este:
- Transpirații, subfebrilitate;
  - Oboseala;
  - Tuse;
  - Toate variantele de mai sus.
13. Locul de elecție al injecției intramusculare este, cu excepția:
- Regiunea supero-externă fesieră deasupra marelui trochanter;
  - Mușchii externi sau anteriori ai coapsei în treimea mijlocie fără rotirea exterioară a membrului inferior;
  - Fața externă a brațului în mușchiul deltoid;
  - Musculatura coapsei cu rotirea exterioară a membrului inferior;
14. Într-o entorsă, la sfârșitul accidentului, cum sunt cele două suprafețe articulare?
- Suprafețele articulare pierd raporturile normale dintre ele;
  - Suprafețele articulare rămân în contact normal;
  - Între suprafețele articulare se interpun formațiuni moi;
  - Una dintre suprafețe prezintă fractura.
15. Simptomatologia fracturilor deschise cuprinde:
- Prezența plăgii deschise;
  - Durerea locală;
  - Deformarea regiunii;
  - Toate cele de mai sus;
16. Semnele clinice în toxiinfecțiile alimentare sunt, cu excepția:
- Vărsături,
  - Scaune diareice,
  - Dureri abdominale;
  - Disurie cu hematurie;
17. Care dintre măsurile de mai jos trebuie luate la locul accidentului, în cazul unei fracturi ale membrului?
- Imobilizare provizorie a fracturii;
  - Reducerea fracturii;

- c) Oxigenoterapia;
- d) Imobilizare în aparat gipsat;

18. Atitudinea de urgență în cazul unui corp străin intraocular este:

- a) Instilarea de soluții oculare dezinfectante;
- b) Pansament steril;
- c) Profilaxia tetanosului;
- d) Toate variantele sunt corecte;

**Notă:**

Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

1. Recoltarea de sânge pentru investigații de laborator se face:

Răspuns corect – 0,50 puncte

- d) Toate variantele sunt corecte - 0,50 puncte.

2. După administrarea subcutanată a insulinei pot apărea următoarele complicații:

Răspuns corect – 0,50 puncte.

- a) Hipoglicemia - 0,30 puncte.
- c) Reacție alergică locală - 0,10 puncte.
- d) Alergia sistemică - 0,10 puncte.

3. Garoul elastic se aplică la:

Răspuns corect – 0,50 puncte.

- a) Deasupra puncției – 0,50 puncte.

4. În cazul unei insuficiențe respiratorii acute prin aspirare de corp străin în căile aeriene, care este atitudinea terapeutică?

Răspuns corect – 0,50 puncte.

- a) Manevra Heimlich; - 0,50 puncte

5. Criza de astm bronșic se caracterizează prin:

Răspuns corect – 0,50 puncte.

- b) Spută cu aspect perlat – 0,10 puncte
- c) Dispnee cu caracter expirator – 0,30 puncte
- d) Bradipnee – 0,10 puncte

6. Conduita de urgență în edemul pulmonar acut:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- d) Toate variantele sunt posibile – 0,50 puncte.
7. Durerea în infarctul miocardic acut prezintă următoarele caracteristici:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- a) Localizare retrosternală sau precordială - 0,50 puncte.
8. Caracteristicile colicii renale sunt:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- d) Localizare lombara unilaterală cu iradiere de-a lungul ureterului și organelor genitale - 0,50 puncte.
9. Care este medicamentul de elecție în cazul unui pacient care prezintă șoc anafilactic?  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- c) Adrenalina – 0,50 puncte.
10. Măsurile de urgență în entorse sunt următoarele, cu excepția:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- c) Administrarea de bronhodilatatoare – 0,25puncte.
- d) Anestezia generala – 0,25puncte.
11. Mijloacele de protecție împotriva virusului imunodeficienței umane (HIV) ale cadrelor medii sunt, cu excepția:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- d) Efectuarea tratamentului injectabil fără mănuși de protecție – 0,50 puncte.
12. Simptomatologia în tuberculoza pulmonară este;  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- d) Toate variantele de mai sus – 0,50 puncte.
13. Locul de elecție al injecției intramusculare este, cu excepția:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- d) Musculatura coapsei cu rotirea exterioară a membrului inferior – 0,50 puncte.
14. Într-o entorsă, la sfârșitul accidentului, cum sunt cele două suprafețe articulare:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.
- b) Suprafețele articulare rămân în contact normal – 0,50 puncte.

15. Simptomatologia fracturilor deschise cuprinde:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.  
d) Toate cele de mai sus – 0,50 puncte.
16. Semnele clinice în toxiinfecțiile alimentare sunt, cu excepția:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.  
d) Disurie cu hematurie – 0,50 puncte.
17. Care dintre măsurile de mai jos trebuie luate la locul accidentului, în cazul unei fracturi ale membrelor?  
Răspuns corect – 0,50 puncte.  
a) Imobilizare provizorie a fracturii – 0,50 puncte.
18. Atitudinea de urgență în cazul unui corp străin intraocular este:  
Răspuns corect – 0,50 puncte.  
d) Toate variantele sunt corecte – 0,50 puncte.

Notă:

Se acordă 1 punct din oficiu.