



GRILĂ DE CORECTARE A LUCRĂRILOR SCRISE
Asistent medical generalist

Subiectul nr. 1

Simptomatologia în colica renală.

Răspuns:

- durere cauză: spasm caliceal; sediu: regiunea lombară unilateral cu iradiere ureterală, org. genitale externe, rădăcina coapsei; caracterul durerii: intensă, profundă, ruptură torsionară, arsură; (0,20p);
- neliniște, agitație, anxietate; (0,10p);
- uneori poziție antalgică: culcat decubit lateral, membru inferior flectat; (0,10p);
- tenesme vezicale; (0,10p);
- disurie, polachiurie, retenție; (0,10p);
- hematurie; (0,20p);
- alte simptome: grețuri, vărsături, meteorism; (0,10p);
- semne generale: agitație, paloare, transpirații, febră, tulburări puls, tensiune; (0,10p).

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 2

Semne clinice în infarctul miocardic acut.

Răspuns:

- Durerea: retrosternală sau precordială (0,10p.) (senzație de constricție sau în gheară, presiune sau un corset de fier, jena retrosternală, arsura, greutate sau apăsare; iradiază în umăr și în brațul stâng, regiunea cervicală, mandibulă; (0,20p) extratoracic – epigastriu, abdomen, brate, antebrate, coate, pumni (0,10p.). Durată; 30 min - 48 ore (0,10p.). Nu cedează la nitriti (0,10p.). Apare în repaus (0,10p.). Însoțită de anxietate extremă, senzație de moarte iminentă, greață și vărsături, transpirații reci, astenie, ametele (0,10p.)
- Hipotensiunea, tahicardie (0,10p.)
- Alte semne: paloare, tegumente reci și umede, puls filiform, alterarea stării generale (0,10p.)

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 3

Colica biliară – cauze.

Răspuns:

- Calculi în vezicula biliară sau în caile biliare (0,20p.)
- Colecistită acută (0,20p.)
- Angiocolite (0,20p.)
- Colecistite cronice, diskinezii biliare (0,20p.)

- Parazitoze intraveziculare (giardia) (0,20p.)

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 4

Primul ajutor în caz de fracturi – reguli generale.

Răspuns:

- Imobilizare provizorie imediata, chiar la locul accidentului, cu blandete si grija (atele confectionate din scanduri, bastoane, bete invelite in material moale) (0,50p.)
- Administrarea unui calmant sau sedativ (0,30p.)
- Transport la spital (0,20p.)

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 5

Determinarea glicemiei capilare (pregătirea pacientului, efectuarea procedurii).

Răspuns:

- Pregătire pacient: identificare (0,10p.), informare si explicare procedura (0,10p.), obtinere consimtamant (0,10p.), asezare in pozitie sezanda cu mana sprijinita sau in decubit dorsal (0,10p.)
- Efectuarea procedurii: se spala mainile, se dezinfecteaza, se pun manusi (0,10p.); se spala mainile pacientului, se sterg pentru a se usca foarte bine pielea (0,10p.), se inteapa lateral la nivelul ultimei falange (0,10p.), se sterge prima picatura cu un tampon uscat (0,10p.), se formeaza a doua picatura care este depusa pe capatul reactiv al bandetei (0,10p.). Glicemia din sangele capilar este cu aproximativ 20 mg mai mare decat cea recoltata din sangele venos. (0,10p.)

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 6

Incidente și accidente care pot surveni la efectuarea injectăiei intramusculare.

Răspuns:

- amorțeli, furnicături sau alterarea funcției musculare; (0,10p);
- paralizia membrului inferior prin înțeparea nervului sciatic; (0,20p);
- noduli prin injectarea unor soluții care precipită sau a unui amestec de soluții incompatibile; (0,20p);
- embolie prin injectarea într-un vas de sânge a unei soluții uleioase; (0,20p);
- pătarea / pigmentarea pielii; (0,10p);
- flegmon prin nerespectarea regulilor de antisepsie / asepsie; (0,20p).

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 7

Insolația – semne clinice și primul ajutor la nivelul cabinetului medical.

Răspuns:

- Semne clinice: cefalee, ameteli, fotofobie, dureri ale globilor oculari, congestia fetei, neliniste (0,20p.), greturi, varsaturi, inapetenta (0,10p.), convulsii, coma (0,10p.)
- Primul ajutor in cabinetul medical: aplicarea de comprese reci/punga cu gheata pe cap (0,10p.), administrarea de antalgice si antiflogistice (0,10p.); controlul functiilor vitale in

caz de coma sau stari convulsive (0,10p.); oxigenoterapie (0,10p.); hidratare prin perfuzii (0,10p.); transportarea la spital (0,10p.)

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 8

Manifestări clinice în hemoragia digestivă superioară masivă.

Răspuns:

- hematemeză; (0,20p);
- melenă; (0,20p);
- semne de șoc hipovolemic: paloare, polipnee, anxietate, extremități reci, puls rapid filiform, sudori reci, sete intensă, grețuri, adinamie, hipotensiune, tendință de pierdere a cunoștinței; (0,60p).

Punctaj total 1 punct.

Subiectul nr. 9

Principalele simptome în bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată.

Răspuns:

- dispnee cu polipnee uneori bradipnee expiratorie.(0,20p)
- cianoză intensă și difuză, predominând la buze, unghii. Cianoză exprimă creșterea hemoglobinei în sângele arterial (prin desaturarea cu O₂ a oxihemoglobinei). (0,20p)
- transpirații profuze., cefalee. (0,20p)
- Anxietate sau somnolență, stare confuzională, uneori stare precomatoasă (0,20p)
- Decompensarea respiratorie a BPOC se asociază de regulă cu decompensarea hemodinamică (cord pulmonar cronic decompensat) cu : tahicardie, tulburări de ritm, extrasistole, hepatomegalie dureroasă, cu meteorism abdominal, jugulare turgescențe. (0,20p)

Punctaj total 1 punct.

- **Se acordă din oficiu 1 p.**