

**Proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă, a postului de asistent medical (generalist)**

**Subiectul nr. 1**

**Incidente și accidente care pot surveni la efectuarea injecției intramusculare. (2 puncte)**

**Răspuns:**

- amorțeli, furnicăături sau alterarea funcției musculare; (0,20 puncte);
- paralizia membrului inferior prin înțeparea nervului sciatic; (0,40 puncte);
- noduli prin injectarea unor soluții care precipită sau a unui amestec de soluții incompatibile; (0,40 puncte);
- embolie prin injectarea într-un vas de sânge a unei soluții uleioase; (0,40 puncte);
- pătarea / pigmentarea pielii; (0,20 puncte);
- flegmon prin nerespectarea regulilor de antisepsie / asepsie; (0,40 puncte).

**Subiectul nr. 2**

**Coma diabetică (hiperglicemică) – tablou clinic. (2 puncte)**

**Răspuns:**

- faza prodromală / precoma: (0,20 puncte);
- anorexie totală, grețuri, vărsături; (0,20 puncte);
- polidipsie; (0,20 puncte);
- poliurie; (0,20 puncte);
- polipnee cu halenă acetonică; (0,20 puncte);
- coma diabetică: (0,20 puncte);
- dispnee, respirația Kusmaul (4 timpi); (0,20 puncte);
- tulburări ale conștienței; (0,20 puncte);
- deshidratare globală: tegumente uscate, extremități reci violacee, pliu persistent, uscăciunea limbii, facies supt, hipotensiune arterială, colaps; (0,40 puncte).

**Subiectul nr.3**

**Hipertensiunea arterială: definiție și regim de viață (2 puncte)**

**Răspuns:**

- **Definiție.** Este un sindrom clinic, reprezintă creșterea valorilor tensionale peste 140 mmHg pentru tensiunea sistolică și peste 90 mmHg pentru tensiunea diastolică – (1,5 puncte)
- **Regim de viață**
- evitarea efortului fizic – (0,10puncte),
- regim alimentar normocaloric sau hipocaloric, hiposodat/desodat –( 0,20 puncte),
- evitarea consumului de alcool, tutun, cafea- (0,10 puncte)
- evitarea stress , situații conflictuale- (0,10 puncte).

**Subiectul nr.4**

**Manifestări clinice în hemoragia digestivă superioară masivă. (2 puncte)**

**Răspuns:**

- hematemeză; (0,30 puncte);
- melenă; (0,30 puncte);

- semne de șoc hipovolemic: paloare, polipnee, anxietate, extremități reci, puls rapid filiform, sudori reci, sete intensă, grețuri, adinamie, hipotensiune, tendință de pierdere a cunoștinței; (1,20 puncte).

### **Subiectul nr.5**

#### **Primul ajutor în caz de fracturi – reguli generale. (1 punct)**

##### **Răspuns:**

- Imobilizare provizorie imediata, chiar la locul accidentului, cu blandete si grija (atele confectionate din scanduri, bastoane, bete invelite in material moale) (0,50 puncte)
- Administrarea unui calmant sau sedativ (0,30 puncte)
- Transport la spital (0,20 puncte)

- **Timp de lucru – 3 ore.**
- **Lucrarea beneficiază de 1 punct din oficiu.**