



**BAREM DE CORECTARE A SUBIECTELOR DE CONCURS
– PROBA SCRISĂ
Pentru ocuparea din sursă externă a patru posturi de
Asistent medical generalist**

**Subiectul 1. Infarctul miocardic acut : semne clinice si conduita de urgenta
in faza de prespitalizare . – 2 puncte**

Răspuns:

Semne clinice -1pct

- **Durerea – 0,3pct.**
 - *localizare -0,06pct*
 - *caracter- -0,06pct*
 - *iradiere- 0,06 pct*
 - *durata - 0,06 pct*
 - *semne si simptome insotitoare – 0,06 pct*
- **Hipotensiunea arteriala – 0,2 pct**
- **Febra – 0,1 pct;**
- **Alte semne :** soc manifestat prin paloare , tegument rece si umed , puls rapid filiform , alterarea starii generale , oligurie grava - 0,2pct
- **Debut atipic** fara durere cu manifestari de soc inexplicabil , tulburari de ritm , insuficienta cardiaca rapid progresiva , edem pulmonar - 0,2pct
- **Conduita de urgenta – faza prespitalizare : 1pct**
- **Faza prespitalizare – definitie – 0,2pct**
- **Prevenirea mortii subite – 0,2 pct**
 - *pozitie bolnav – 0,1 pct*
 - *psihoterapie – 0,1 pct*
- **Preintampinarea altor complicatii – 0,5 pct**
 - *Sedarea durerii : Morfina , Mialgin ,Fortral – 0,1pct*
 - *Urmarirea si mentinerea tensiunii arteriale cu PEV cu glucoza 5%, dextran , HHC – 0,1 pct*
 - *Urmarirea pulsului si corectarea extrasistolelor cu xilina de uz cardiologic – 0,1pct*
 - *Mentinerea permeabilitatii cailor respiratorii prin aspiratie – 0,1pct*
 - *Oxygenoterapie – 0,1 pct*
- **Scurtarea timpului pana la internarea in spital – 0,1 pct**
 - *Transportul de urgenta intr-o unitate spitaliceasca cu autosanitara, pe targa preferabil „unitate mobila coronariana”*

Subiectul 2 .Enumerati formele clinice de hepatite dupa evolutie si gravitate

- 2 pct

Răspuns:

- ✓ Forme anicterice – 0,2 pct
- ✓ Forma comuna - 0,2 pct
- ✓ Formele prelungite - 0,2 pct
- ✓ Forma colestatica - 0,2 pct
- ✓ Forma prelungita simpla - 0,2 pct
- ✓ Hepatita acuta persistenta - 0,2 pct
- ✓ Hepatita cu recrudescențe(ondulanta) - 0,2 pct
- ✓ Hepatita prelungita cu potential de cronicizare - 0,2 pct
- ✓ Formele severe - forma comatoasa – 0,2 pct
hepatita fulminanta - 0,2 pct

Subiectul 3 .Entorse – simptomatologie si tratamentul entorsei simple – 2 pct

Răspuns:

Simptomatologie : 1,5 pct

- Durerea : vie, localizare –locul de insertie al ligamentelor, durata- 0,25 pct
- Impotenta functionala: definitie - 0,25 pct
- Echimoza – conditii de aparitie, semnificatie, atitudine - 0,25 pct
- Edemul local – mecanism de aparitie - 0,25 pct
- Hemartroza – definitie, evidentiere clinica(socul rotulian), hidrartroza - 0,25 pct
- Mobilitatea anormala a articulatiei : semn tardiv, semnificatie (rupturi importante) , consecinte - 0,25 pct

Tratament – 0,5 pct

- repaus articular – 0,1 pct
- imobilizarea articulatiei – descriere – 0,15 pct
- suprimarea durerii (xilina. Procaina intraarticular) – 0,15pct
- miscari de recuperare – 0,1 pct

Subiectul 4. Colica renala : simptomatologie - 2 pct .

Răspuns:

- Durere – 0,2 pct
- Neliniste, agitati , anxietate – 0,2 pct
- Uneori pozitie antalgica – 0,2 pct
- Tenesme vezicale – 0,2 pct
- Disurie, polakiurie – 0,2 pct
- Hematurie – 0,2 pct
- Alte simptome: greturi , varsaturi, meteorism, oprirea tranzitului intestinal, cu tablou de ocluzie intestinala dinamica - 0,3 pct
- Semne generale: - 0,2 pct
 - bolnav agitat, palid, transpirat, extremitati reci, puls tahicardic, rar bradicardic – 0,1 pct
 - in formele prelungite: hipotensiune, lipotimii , stare de soc, convulsii la copii, delir la adulti – 0,1 pct
- Examen local : - 0,3 pct
 - exacerbaria durerii la percutia regiunii lombare – 0,1pct
 - la palpare se pun in evidenta cele trei puncte dureroase ala ureterului: superior, mijlociu, inferior - 0,1 pct
 - durata colicii de la cateva minute la 2-6 ore – 0,1 pct

Subiectul 5. Atribuțiile asistentei medicale responsabile de salon în activitatea de supraveghere , prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale . – 1 punct .

Răspuns:

- a) implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor – 0,12 pct.
- b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților - 0,11 pct.
- c) menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din salon - 0,11 pct.
- d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul șef de secție în legătură cu apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa - 0,11 pct.
- e) inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale - 0,11 pct.
- f) limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare - 0,11 pct.
- g) semnalează medicului curant existența elementelor sugestive de infecție asociată asistenței medicale -0,11 pct.
- h) participă la pregătirea personalului - 0,11 pct.
- i) participă la investigarea focarelor - 0,11 pct.

Se acordă un punct din oficiu.