



Proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, la concursul organizat pentru ocuparea, din sursă externă, a posturilor vacante de asistent medical generalist-sectorul medical

1. Simptomatologia crizei de astm bronșic. – 2p.

- Incepe, de regula brusc (0,2p.)
- Survine mai frecvent noaptea (0,2p.)
- Dispnee cu caracter expirator prelungit (0,4p), ortopnee (0,2p.), urmata de tuse si expectoratie mucoasa (0,4p.)
- Spaima, sete aer (0,2p.), tegument palid cenușiu, cu transpiratii reci (0,2 p.)
- Se termina relativ brusc (0,2p.)

2. Colica biliara - cauze. – 2p.

- Calculi in vezicula biliara sau in caile biliare (0,4p.)
- Colecistita acuta (0,4p.)
- Angiocolite (0,4p.)
- Colecistite cronice, diskinezii biliare (0,4p.)
- Parazitoze intraveziculare (giardia) (0,4p.)

3. Incidente, accidente in administrarea medicamentelor prin injectie intravenoasa. – 2p.

- Flebalgie (0,5p.)
- Hematom (0,5p.)
- Ameteli, lipotimie, colaps (0,5p.)
- Reactii anafilactice la solutiile injectate in scop explorator (0,5p.)

4. Care sunt valorile normale ale glicemiei la adult. – 1p.

- 80-120 mg/dL

5. Recoltarea exudatului faringian – pregatire pacient, efectuarea recoltarii. – 2p.

- Pregatire pacient: inaintea administrarii antibioticelor (0,2p.); in dimineata recoltarii nu mananca, nu bea, nu face gargara, nu se spala pe dinti, nu-si instileaza picaturi in nas (0,2p.)
- Efectuarea tehnicii: se verifica daca pacientul a respectat recomandarile privind procedura (0,2p.). Se orienteaza cu fata spre lumina in pozitie sezanda (0,2p.). Se spala mainile cu apa si sapun, se pun manusi de UF si masca de protectie (0,2p.). Pacientul deschide gura larg, inspira adanc, se apasa limba cu spatula (0,2p.), se sterge depozitul faringian si amigdalian cu tamponul steril (0,2p.). Se retrage tamponul cu atentie pentru a nu atinge limba, dintii si buzele (0,2p.) si se introduce in eprubeta protectoare care se eticheteaza (0,2p.) si se trimite la laborator (0,2p.).

Din oficiu: 1 punct